



4 venčni listi



Alpski talin

Thalictrum alpinum

Zlatichevke

JULIJ–AVG. 5–15 cm ▼ (☠)



Značilnost Rumeni prašniki so izrazito daljši od cvetnega venca.

Opis Cvetno odevalo 4–5-delno, rdečkasto rjavo. Cvet viseč. Prašniki z vijoličastimi prašnicami. Listi v pritlični rozeti, 1–2-krat pernati, roglji (lističi) z narezanim robom.

Razširjenost Zahodne, Centralne in Južne apn. Alpe do 2800 m: vlažne kamnite trate, tudi barja. Redka.



Vetrovka

Thalictrum aquilegifolium

Zlatichevke

MAJ–JUNIJ 50–120 cm ▼



Značilnost Cvetovi sestavljeni iz šopasto štrlečih prašnikov.

Opis Cvetni listi neznatni in kmalu odpadejo. Listi podobni kot pri orlicah, 1–2-krat pernati, roglji (lističi) z narezanim robom.

Razširjenost Med 900 in 2500 m. Zelo pogosta, zlasti na apnenčastih, občasno mokrih tleh.



Alpski kislec

Oxyria digyna

Dresnovke

JULIJ–AVG. 5–15 cm



Značilnost Listi v obrisu okroglo ledvičasti.

Opis Cvetovi neznatni, rdečkasto-zelenkasti, v rahlem, vejnatem socvetju. Listi dolgopecljati.

Razširjenost Na dolgo zasneženih, z apnencem revnih tleh: snežne dolinice, melišča in kamnite trate. Razpršena.



Pirenejski kamnokras

Petrocallis pyrenaica

Križnice

JUNIJ–JULIJ 2–8 cm ▼



Značilnost Listi večinoma trikrpati.

Opis Rastlina je blaziničasta. Cvetovi do 1 cm široki, prijetno dišeči. Steblo brez listov. Listi 3–5-krpati in štrleče dlakavi.

Razširjenost Pretežno v Sevnih in Južnih apn. Alpah: na suhih in kamnitih tleh med 1700 in 3500 m. Redka.



Okroglolistni mošnjak

Thlaspi cepaeifolium

Križnice

JUNIJ–JULIJ 5–15 cm



Značilnost Listi so okrogli in celorobi.

Opis Raste v redkih šopih. Cvetovi rožnato vijoličasti, 8–18 mm široki. Stebloolistano. Pritlični listi v rozeti.

Razširjenost Povsod v Alpah: med kamenjem in na meliščih med 1500 in 3300 m. V Apneniških Alpah pogosta, druga redka.



Spomladanska resa

Erica carnea

Vresovke

FEB.–JULIJ 10–30 cm ▼



Značilnost Ozko zvonasti cvetovi, vsi obrnjeni v eno stran.

Opis Čaša krajša od 4-rogljatega venca, iz katerega štrlijo vijoličasti prašniki. Listi igličasti, po 3–4 v vretcih, listni rob spodvihan.

Razširjenost Redki iglasti gozdovi in resave pritlikavih grmičev do 2700 m. Pogosta.





4 venčni listi



Zdravilna strašnica

Sanguisorba officinalis

Rožnice

JUNIJ–SEP. 30–90 cm



Značilnost V valjastih do jajčastih socvetjih je po 20–40 cvetov.

Opis Posamezni cvetovi majhni, le s 4 čašnimi listi. Listi lihopernati s 7–15 napiljenimi roglji.

Razširjenost Med 400 in 2400 m: na (občasno) vlažnih pašnikih, nizkih barjih. Razpršena.



Dišeči volčin

Daphne cneorum

Volčinovke

APRIL–JULIJ 10–30 cm ▼



Značilnost Listi so enakomerno razporejeni po vsej dolžini poganjkov.

Opis Pritlikav grm z dlakavimi vejnatimi poganjki. V šopkih po 6–10 po janežu dišečih cvetov z enobarvno in dlakavo cvetno cevjo.

Razširjenost Na apnencu do 2000 m: resave pritlikavih grmičev, redki gozdovi in grmovje, kamnite trate. Redka.



Progasti volčin

Daphne striata

Volčinovke

MAJ–AVG. 5–15 cm ▼



Značilnost Listi so le pri vrhu poganjkov.

Opis Pritlikav grm z golimi poganjki. V kobilastih šopkih 8–15 po španskem bezgu dišečih cvetov s progasto in golo cvetno cevjo.

Razširjenost Pretežno na apnencu v Vzhodnih Alpah; do 2500 m: na kamnitih, s hranili revnih tleh. Redka.



Črvinkasti vrbovec

Epilobium alsinifolium

Svetlinovke

JUNIJ–AVG. 5–25 cm



Značilnost Listi so odebeljeni in bleščeči.

Opis Venčni listi 4, plitvo zarezani, rdeče žilnati. Listi nasprotni, 2–4 cm dolgi, plitvo nazobčani.

Razširjenost Na mokrih tleh med 1200 in 2900 m: močvirnata povirja, obrežja, sestoji visokih steblik. Razpršena do pogosta.



Ozkolistno ciprje

Epilobium angustifolium

Svetlinovke

JUNIJ–AVG. 50–150 cm



Značilnost Socvetje je visoko in mnogocvetno.

Opis Cvetovi do 2,5 cm široki. Listi premenjalni, črtalasti do suličasti, 5–20 cm dolgi, spodaj sinje zeleni. Mlade rastline užitne.

Razširjenost Med 400 in 2500 m: poseke, grmovje, grušč. Pogosta.



Fleischerjev vrbovec

Epilobium fleischeri

Svetlinovke

JULIJ–AVG. 10–30 cm ▼



Značilnost Veliki cvetovi so široki 2–4 cm.

Opis V grozdih na vrhu poganjkov je po 5–10 cvetov. Listi premenjalni, gosto rastoči in le 1–4 mm široki.

Razširjenost Predvsem v Zahodnih Alpah in proti vzhodu do Tirolske; do 2500 m: grušč in rečna prodišča. Razpršena.





4 venčni listi



Predalpski vrbovec

Epilobium alpestre

Svetlinovke

JUNIJ–SEP. 30–80 cm



Značilnost Po 3–4 listi v navideznih vretencih.

Opis Steblo z 2–4 vzdolžnimi progami dlačic. Listi široko vzilčasti, zgoraj izrazito bleščeči.

Razširjenost Na vlažnih, s hranili bogatih tleh; med 1300 in 2400 m: sestoji visokih steblik, jelševo grmovje. Pogosta.



Poljski sviščevce

Gentianella campestris

Sviščevke

JULIJ–SEP. 5–20 cm ▼



Značilnost Čašni listi prosti skoraj do dna.

Opis Cvetovi v zalistjih in pri vrhu stebela, 1–3 cm dolgi, rdeče vijoličasti, v ustju resičasti.

Razširjenost Na apnenčastih, s hranili revnih tleh med 1000 in 2000 m: gorski travniki in pašniki. Razpršena.



Grmičasti jetičnik

Veronica fruticulosa

Črnobinovke

APRIL–AVG. 10–20 cm



Značilnost Rožnati venčni listi imajo temno rdeče žile.

Opis Rastline z olesenelimi pritlikami. Steblo gosto olistano z navzkrižnimi listi. Listi ozko ovalni do podolgaсти.

Razširjenost Zahodne in Južne apn. Alpe, manjka v severnem delu Vzhodnih Alp; do 2400 m: skalne razpoke in skalnat grušč. Razpršena.



Alpski klinček

Dianthus alpinus

Klinčnice

JUNIJ–AVG. 3–15 cm ▼



Značilnost Sredi cveta je temnejši kolobar.

Opis Cvetovi 1–2 cm široki, belo lisasti. Steblo večinoma enocvetno. Listi podolgasti do suličasti, do 5 mm široki.

Razširjenost V severnih Vzhodnih Alpah do 2400 m. Izključno na apnencu: gruščnate prekinjane trate, grmovje. Redka.



Brkati klinček

Dianthus barbatus

Klinčnice

JUNIJ–SEP. 20–70 cm ▼



Značilnost Cvetovi v gostem socvetju na vrhu stebela.

Opis Do 30 cvetov v socvetju, obdanem s koničastimi ovršnimi listi. Listi široki do 2 cm.

Razširjenost V jugovzhodnem delu Alp med 1000 in 2500 m: suha, apnenčasta in s hranili bogata tla. Redka, ponekod podivjana.



Ledeniški klinček

Dianthus glacialis

Klinčnice

JULIJ–AVG. 2–8 cm ▼



Značilnost Listi segajo do višine cvetov ali više.

Opis Cvetovi purpurno rdeči, 1–2 cm široki. Steblo enocvetno. Listi ozki, do 5 cm dolgi.

Razširjenost Samo v vzhodnem delu Centralnih Alp; do 2900 m: kamnite trate in podobna kamnita vetrovna mesta. Redka.

